# Kỹ thuật canh tác lúa Đài Thơm 8 để đạt năng suất tối đa

Kỹ thuật canh tác lúa Đài Thơm 8 đang là chủ đề được rất nhiều bà con nông dân quan tâm. Đây là giống lúa cho gạo ngon, xuất khẩu tốt, nhưng lại có nhược điểm là thân rạ mềm, dễ đổ ngã nếu bón thừa đạm hoặc quản lý nước không tốt.

Bài viết dưới đây tổng hợp quy trình chuẩn từ Vietnam Light kết hợp với kinh nghiệm thực tế tại ruộng để giúp bà con có một vụ mùa thắng lợi.

## Đặc điểm sinh trưởng của giống lúa Đài Thơm 8

**Thời gian sinh trưởng:** Ngắn ngày (90-100 ngày).

**Chiều cao:** 95-100cm (cây cao trung bình).

**Khả năng đẻ nhánh:** Khá mạnh.

**Đặc điểm nổi bật:** Chịu phèn mặn khá, bông dài, kết hạt dày. Chất lượng hạt gạo dài, cơm dẻo, thơm nhẹ.

**Nhược điểm:** Dễ nhiễm bệnh đạo ôn và bạc lá nếu dư phân, dễ đổ ngã ở giai đoạn trỗ chín.

Do đó, mục tiêu của kỹ thuật canh tác lúa Đài Thơm 8 chuẩn là phải tạo được bộ khung cây cứng cáp ngay từ giai đoạn đầu.




*Chất lượng hạt gạo lúa Đài Thơm 8*

# Kỹ thuật ngâm ủ và gieo sạ

## Mật độ gieo sạ

**Khuyến cáo cho khu vực ĐBSCL:** 100 – 120 kg/ha . Mật độ này giúp lúa đẻ nhánh tối ưu, hạn chế sâu bệnh do sạ quá dày.

## Xử lý hạt giống

**Phơi nắng:** Phơi nhẹ 30 phút trước khi ngâm.

**Trường hợp lúa hết miên trạng (Sau 30 ngày SX):** Ngâm nước sạch 24 giờ (tỷ lệ 1 giống : 2 nước). Thay nước rửa chua sau 10-12 giờ. Tuyệt đối không ngâm axit.

**Trường hợp lúa còn miên trạng (Ngủ nghỉ):** Cần phá miên trạng bằng Axit Nitric ($HNO_3$) 60%.

- Pha: 60ml $HNO_3$ vào 20 lít nước cho 20kg giống.
- Ngâm: 24 giờ trong dung dịch axit, vớt ra rửa sạch, ngâm tiếp nước sạch 12 giờ.

**Kỹ thuật ủ:** Ủ khoảng 36 giờ. Sau 24 giờ đầu, cần ngót nước (tưới nước rồi để ráo) ủ tiếp để mầm ra đều. Không ủ bí bằng bao nylon.

# Quy trình bón phân cân đối

Lượng phân bón tham khảo (kg/ha)

| GIAI ĐOẠN | THỜI ĐIỂM (NSS) | VỤ ĐÔNG XUÂN | VỤ HÈ THU/THU ĐÔNG |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 (Mạ) | 7-10 NSS | 40kg DAP + 35kg Ure + 15kg Kali | 40kg DAP + 40kg Ure + 15kg Kali |
| Đợt 2 (Đẻ nhánh) | 18-20 NSS | 60kg DAP + 75kg Ure + 35kg Kali | 60kg DAP + 60kg Ure + 35kg Kali |
| Đợt 3 (Đón đòng) | 40-45 NSS | 40kg Ure + 30kg Kali | 30kg Ure + 30kg Kali |
| Đợt 4 (Nuôi hạt) | Sau trổ đều 5-7 ngày | 20kg Ure + 20kg Kali | 10kg Ure + 20kg Kali |

**Lưu ý thực tế:** Bà con cần "nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây". Nếu lúa xanh đậm, dư lá thì giảm Ure, tăng Kali. Nếu lúa vàng, thiếu sức thì bón thêm Ure.

**Bí quyết "Hãm lóng – Cứng cây" giai đoạn 27 – 30 ngày**

## Tại sao phải xử lý giai đoạn 27-30 ngày

Lúc này lúa bắt đầu vươn lóng. Nếu không kiểm soát, lóng sẽ dài, cây yếu, dễ đổ ngã. Ngoài ra, cây mẹ thường phát triển lấn át cây con, khiến ruộng lúa không đồng đều.

## Giải pháp kỹ thuật

Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng (Không dùng thuốc ức chế 2.4D):

- Phun các sản phẩm chứa Kali, Humic, Vi lượng hoặc thuốc điều hòa sinh trưởng chuyên dụng.
- Tác dụng: Giúp ngắn lóng, dày thành lóng, đứng lá. Quan trọng nhất là điều hòa dinh dưỡng, san sẻ từ cây mẹ sang cây con, giúp chồi con lớn nhanh, đạt kích thước 8/10 hoặc 9/10 so với cây mẹ.
- Cảnh báo: Tránh dùng chất ức chế sinh trưởng mạnh (như 2.4D liều thấp) vì dễ làm lúa bị "đơ", rễ kém phát triển, lá xòe ngang dễ nhiễm bệnh.

## Kỹ thuật xiết nước (rút nước phơi ruộng)

Thực hiện ngay giai đoạn 30 NSS (sau khi lúa nở bụi kín hàng).

Cắt nước cho ruộng khô, nứt chân chim nhẹ.

Lợi ích: Cắt đứt nguồn đạm tạm thời giúp rễ lúa buộc phải ăn sâu xuống đất tìm nước (chống đổ ngã cực tốt), xả độc hữu cơ và hạn chế chồi vô hiệu.

# Quản lý dịch hại và tưới nước

## Quản lý nước

**0 – 7 ngày:** Giữ ẩm hoặc mực nước thấp.

**7 – 20 NSS:** Giữ nước 2-3cm để bón phân, giúp lúa đẻ nhánh.

**30 NSS:** Xiết nước

**40 – 45 NSS (Đón đòng):** Bơm nước lại, giữ mức 10-15cm đến khi lúa chín sáp.

**Trước thu hoạch:** Tháo khô nước trước 7-10 ngày để dễ thu hoạch.

## Phòng trừ sâu bệnh cho lúa Đài Thơm 8

**Đạo ôn:** Phun ngừa vào giai đoạn sau cử phân 2, chuẩn bị trổ và trổ đều. (Hoạt chất tham khảo: Tricyclazole).

**Sâu cuốn lá/Sâu đục thân:** Phun khi sâu tuổi 1-2. (Hoạt chất tham khảo: Emamectin benzoate – Sản phẩm **Gunner 64EC**).




*Thuốc trị sâu ăn lá Gunner*

**Lem lép hạt:** Phun ngừa 2 giai đoạn: Đòng trổ (trổ lẹt xẹt) và trổ đều. (Hoạt chất tham khảo: Azoxystrobin + Difenoconazole – Sản phẩm tham khảo: **Till Mát 400SC**).




*Thuốc trừ nấm bệnh Till Mát 400SC*

**Bệnh vàng lá do vi khuẩn (bạc lá, đốm sọc, lép vàng):** Thăm đồng thường xuyên, xử lý ngay khi chớm bệnh. (Hoạt chất tham khảo: Kasugamycin, Ningnanmycin, Bismerthiazol, Streptomycin Sulfate, Oxolinic Acid – Sản phẩm tham khảo: **Kháng sinh thực vật**).




*Sản phẩm Kháng sinh thực vật*

## Thu hoạch

Tiến hành thu hoạch khi 98% số hạt đã chín (vàng mơ) và lá lúa chuyển sang màu vàng rơm. Không nên để lúa quá chín sẽ dễ bị rụng hạt khi thu hoạch bằng máy, ảnh hưởng đến năng suất.

## Kết luận

Áp dụng đúng kỹ thuật canh tác lúa Đài Thơm 8 kết hợp giữa quy trình chuẩn và mẹo xử lý giai đoạn đẻ nhánh (27-30 ngày) sẽ giúp bà con có ruộng lúa cứng cây, sạch bệnh, bông to và đạt năng suất vượt trội. Chúc bà con một vụ mùa bội thu!